

Важным условием качественной диагностики является подготовка к исследованию:

### Колоноскопия

- ✓ За 3 дня до исследования необходимо придерживаться диеты, исключив полностью из рациона растительную пищу, богатую клетчаткой (овощи, фрукты, ягоды, зелень, выпечку, зерновые культуры)
- ✓ За 24 часа до исследования разрешается прием только прозрачной жидкости
- ✓ Обязательна двухэтапная подготовка препаратом (Мовипреп, Лавакол), который назначил врач: вечером (накануне исследования) и утром в день исследования (за 2-3 часа)

## КБ на Пятницком шоссе МЕДСИ

(на базе Клинической больницы МЕДСИ)  
Московская обл., п/о Отрадное, Пятницкое шоссе,  
6-й км  
+7 (495) 730-57-36

Режим работы:

Пн-Пт: 08.00 - 21.00

Сб, Вс: 09.00 - 15.00

Оплата: наличные и карта

Парковка на территории больницы - бесплатно

(495) 7 800 500

24/7

[www.medsir.ru](http://www.medsir.ru)



медицина компетенций

Реклама. АО «Медси 2». Лицензия № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



**Скрининг колоректального рака  
и рака желудка** в клинике МЕДСИ  
на Пятницком шоссе



медицина компетенций

Рак желудка и толстой кишки занимают третье и четвертое место в мировой статистике онкологических заболеваний.

В группе риска люди:

- ✓ Старше 40 лет
- ✓ С наследственной предрасположенностью (онкозаболевания в семье)
- ✓ С полипами толстой кишки
- ✓ Страдающие запорами
- ✓ С воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта
- ✓ С нарушениями питания (частое употребление красного мяса, пищи с высоким содержанием жиров и углеводов)
- ✓ Ведущие малоподвижный образ жизни

На ранних стадиях, практически в 100% случаев, онкологию можно вылечить, сохранив при этом целостность пораженных органов и их функциональные возможности. Но, как правило, ранние формы рака симптоматически никак себя не проявляют, и пациенты долгое время не обращаются к врачу за медицинской помощью. Симптомы начинают появляться на более поздних стадиях, когда болезнь прогрессирует, и в таком случае возможность вылечить заболевание и вернуть пациента к полноценной жизни значительно снижается.

**В России 65-70% рака выявляют уже на 3-4 стадии.**

Главными причинами запущенной стадии онкологических заболеваний являются несвоевре-

менная диагностика и позднее обращение за медицинской помощью.

**Выявить рак на ранней стадии можно только на скрининговом обследовании.**

**Скрининг** - это программа диагностики, которая позволяет выявить бессимптомный рак у пациентов группы риска.

В странах, где развита профилактическая скрининговая диагностика в 80% случаев рак выявляется на ранней стадии.

**Мы рекомендуем всем, кто входит в группу риска проходить диагностику:**

- ✓ **Гастроскопию (1 раз в год)**
- ✓ **Колоноскопию (1 раз в 2 года)\***

\*При отсутствии патологии в двух скрининговых исследованиях возможно увеличение межскринингового интервала до 5 – 10 лет

Отделение эндоскопии клиники МЕДСИ на Пятницком шоссе оснащено передовым видеоборудованием экспертного класса с высокоразрешающей способностью и возможностью узкоспектрального картирования слизистой, что позволяет эффективно выявлять ранние формы рака и предраковые изменения слизистой. Исследование проводится под внутривенной седацией (во сне). Возможно проведение комплексного исследования ЖКТ (гастроскопия и колоноскопия) в один день, удаление мелких полипов (предраковое состояние) сразу при обнаружении малоинвазивным методом, не требующим госпитализации. Для эндоскопического удаления крупных новообразований (более 1 см) требуется госпитализация в стационар.